

Ce conseil vous est donné par votre pépiniériste :

## Central Jardin

110 rue de l'institut 1331 Rosières Tel 02/ 653.54.78

10 allée le cavalier Tel 067 79 00 49

Retrouvez nos info. sur Internet : [www.central-jardin.be](http://www.central-jardin.be)

# MALADIE DU FEUILLAGE DES LAURIERS CERISES



### SYMPTÔMES:

Dépôt blanchâtre sur les jeunes feuilles entraînant d'abord une déformation de celle-ci. Ensuite déformation, brunissement total et perforation des feuilles atteintes. Enfin, chute de celle-ci. Ceci est dû à une maladie cryptogamique (*Sphaerotheca pannosa*):

**L' OIDIUM PERFORANT DU LAURIER CERISE.**

### COMMENT TRAITER?

- 1 tailler les extrémités atteintes. Les brûler, les détruire ou les évacuer mais surtout ne pas les conserver dans un coin du jardin ou sur le compost.
- 2 pulvériser avec:
  - a. EMINENT 7 ML
  - b. BAYFOLAN 100 ML

Ces DEUX produits sont à mélanger dans 10 litres d'eau.

Faire une première série de trois pulvérisations, chacune à 1 semaine d'intervalle.

Ensuite pulvériser une fois toutes les 2 semaines. Le traitement doit se faire par temps calme, sur un feuillage sec, pas en plein soleil et il ne peut pas pleuvoir dans les 6 heures qui suivent la pulvérisation.

### CAUSE :

Cette maladie apparaît surtout sur des plantes sensibilisées par un état de famine, une acidité élevée (pH trop bas) et des conditions climatiques favorables. L'acidité du sol rend les lauriers encore plus sensibles. Un pH trop bas (trop acide) entraînant une mauvaise absorption de la potasse (K). Dans le cas d'un pH vraiment trop bas, la potasse disparaît. Or, celle-ci est un élément majeur dans la nutrition des végétaux. Non seulement elle stimule la floraison et la fructification mais surtout, c'est l'élément principal du renforcement des cellules. Sa carence n'empêche pas la plante de pousser. Mais les feuilles seront plus fines, plus tendres et de ce fait, beaucoup plus sensibles aux maladies.

### **COMMENT L' EVITER DANS L' AVENIR ?**

Ce n'est pas parce-que votre haie a sa taille optimale que vous ne devez plus la nourrir correctement. Il y a une différence entre les apports en phase de croissance ou de soins et ceux à faire en phase d'entretien. Nous vous conseillons ceci:

- 1 Phase de croissance ET de soins:
  - a. en mars, mai, juillet et septembre, apport d'un engrais spécial pour haies à feuillage persistant + de la potasse.
  - b. En février, mai et novembre, poudrage d'un amendement calcaire adapté à votre sol + de la potasse.
- 2 Phase d'entretien:
  - a. en mars et en juillet, apport d'un engrais spécial pour haies à feuillage persistant.
  - b. En février et en novembre, un apport d'un amendement calcaire approprié + de la potasse.

Pour vraiment faire un travail juste et efficace, nous vous conseillons de faire une analyse de votre terre. Venez avec un échantillon de sol (un petit pot de yaourt suffit!) et notre ordinateur vous imprimera le résultat. Nous pourrions vous donner un conseil personnalisé. Nous nous tenons à votre entière disposition pour tous les renseignements qui vous seraient utiles.