



Central Jardin

Trois adresses pour mieux vous servir:

110 rue de l'institut 1331 Rosières Tel 02/ 653.54.78

10 Allée le cavalier 1470 Genappe 067/ 79 00 49

Internet : www.central-jardin.be Mail : info@central-jardin.be

NOIRCISSEMENT DES BOUTONS A FLEURS DES RHODODENDRONS.



Vecteur : la Cicadelle



SYMPTÔMES:

Le dessèchement des boutons floraux commence d'abord par un brunissement suivi d'un noircissement. Au printemps apparition de poils noirs sur ceux-ci. Disparition progressive de la floraison. Ceci est dû à la combinaison d'une attaque d'insectes (cicadelles) et d'un cryptogame (*Pycnostysanus azaleae*) qui se développent dans les boutons toute l'arrière saison et en hiver.

Le seul traitement est préventif à partir de la fin de la floraison ou dès le beau temps si la majorité des boutons sont déjà atteints.

COMMENT TRAITER?

- 1 Enlever le maximum des boutons atteints sur la plante, ramasser les feuilles qui jonchent le sol. Les brûler, les détruire ou les évacuer mais surtout ne pas les conserver dans un coin du jardin ou sur le compost.
- 2 Pulvériser avec:
 - a. **For-INSECT 125 ML**
 - b. **DITHANE 30 GRMS (2 cuillères à soupe rase)**
 - c. **BAYFOLAN 100 ML**

Ces trois produits sont à mélanger dans 10 litres d'eau.

Faire une première série de **quatre pulvérisations**, chacune à 1 semaine d'intervalle. Ensuite pulvériser une fois toutes les 2-3 semaines jusqu'à mi-octobre. Le traitement doit se faire par temps calme, sur un feuillage sec, pas en plein soleil et il ne peut pas pleuvoir dans les 6 heures qui suivent la pulvérisation.

- 3 Epandre un engrais spécial rhododendron en mars, mai, juillet et septembre. Faire un apport de potasse en février, juillet et novembre. En période sèche, bien arroser.

CAUSE:

Cette maladie est nommée 'dépérissement des boutons à fleurs'. Ces petits poils noirs qui ressemblent à de la barbe sont la signature du "**BUD BLIGHT**" ou "**BUD BLAST**"; ce champignon tue les boutons floraux. Elle est favorisée par la **cicadelle** (*Graphocephala fennayi* ; voir photo ci-dessus).

COMMENT L' EVITER DANS L' AVENIR ?

Il faut faire de la prévention. Pour contrer ce champignon il faut donc, curieusement, utiliser un insecticide. Aucun fongicide n'est reconnu vraiment efficace et curatif à l'heure actuelle. C'est la prévention qui sera la plus efficace. Ce qui signifie: quand vous observez les premiers symptômes, il est déjà trop tard. Il faut néanmoins en ajouter un lors des pulvérisations. Il est nécessaire de pulvériser dès la fin de la floraison (+/- juin) jusqu'à fin septembre ou même plus tard si le temps est doux. Courant de l'hiver pulvériser tous les 15 jours, sauf gelée, avec de la bouillie bordelaise.

Une bonne fertilisation régulière diminue fortement l'impact sur le volume de floraison.

Nous nous tenons à votre entière disposition pour tous les renseignements qui vous seraient utiles.